

食道がん

| 登録番号 | レジメン名称 | 薬剤名 | 1日基準投与量 (mg) | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 (日目) | 1クール (日間) | 備考 |
|------|------------------|----------|-----------------------|------|------|--|--------------|----|
| 食道-1 | 5-FU+CDGP (high) | アクプラ | 80 mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | 1 | 28 | |
| | | フルオロウラシル | 800 mg/m ² | 点滴静注 | 24時間 | 1~5 | | |
| 食道-2 | DOC | ドセタキセル | 70 mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | 1 | 21 | |
| 食道-3 | FP+RT併用 | シスプラチン | 70 mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | 1 | 28 | |
| | | フルオロウラシル | 700 mg/m ² | 点滴静注 | 24時間 | 1~4 | | |
| 食道-4 | FP | シスプラチン | 80 mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | 1 | 28 | |
| | | フルオロウラシル | 800 mg/m ² | 点滴静注 | 24時間 | 1~5 | | |
| 食道-5 | VNR+CDDP | ロゼウス | 25 mg/m ² | 点滴静注 | 10分 | 1.8 | 21 | |
| | | シスプラチン | 80 mg/m ² | 点滴静注 | 2時間 | 1 | | |
| 食道-6 | biweeklyDOC+CDGP | ドセタキセル | 30 mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | 1 | 14 | |
| | | アクプラ | 30 mg/m ² | 点滴静注 | 1時間 | 1 | | |
| 食道-7 | オプジーボ (2週毎) | オプジーボ | 240 mg/body | 点滴静注 | 30分 | 1 | 14 | |
| 食道-8 | オプジーボ (4週毎) | オプジーボ | 480 mg/body | 点滴静注 | 30分 | 1 | 28 | |
| 食道-9 | 5-FU+CDGP (low) | アクプラ | 5 mg/body | 点滴静注 | 2時間 | 1~5、8~12 | 28 | |
| | | フルオロウラシル | 500 mg/body | 点滴静注 | 24時間 | 15~19、22~26 1~5、8~12 15~19、22~26 | | |

2022/4現在