

白血病・骨髄異形成症候群

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
血-1	ALL-202寛解導入 (25～59歳)	ダウノマイシン	60 mg/m ²	点滴静注	1時間	1～3	28	
		オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1.8.15.22		
		エンドキサン	1200 mg/m ²	点滴静注	3時間	1		
		ロイナーゼ	3000単位 IU/m ²	点滴静注	2時間	9.11.13.16.18.20		
		プレドニン	60 mg/m ²	内服	朝食後	1～21		
血-2	ALL-202寛解導入 (60歳以上)	ダウノマイシン	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	1～3	28	
		オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1.8.15.22		
		エンドキサン	800 mg/m ²	点滴静注	3時間	1		
		ロイナーゼ	3000単位 IU/m ²	点滴静注	2時間	9.11.13.16.18.20		
		プレドニン	60 mg/m ²	内服	朝食後	1～7		
血-3	ALL-202地固め①、④	キロサイド	2000×2 mg/m ²	点滴静注	3時間×2	1～3	21	60歳以上は1000mg/m ² ×2
		エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	1時間	1～3		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	1		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	1		
		デキサート	40 mg/m ²	点滴静注	1時間	1～3		
血-4	ALL-202地固め②、⑤	メソトレキセート	3000 mg/m ²	点滴静注	24時間	1.15	28	60歳以上は1500mg/m ² ※ロイコボリン併用
		オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1.15		
		ロイケリン	25 mg/m ²	内服	就寝前	1～21		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	1.15		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	1		
血-5	ALL-202地固め③	オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1.8.15	42	
		ドキソルビシン	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	1.8.15		
		エンドキサン	1000 mg/m ²	点滴静注	3時間	29		
		キロサイド	75 mg/m ²	点滴静注	1時間	29～33.36～40		
		デカドロン	10 mg/m ²	内服	-	1～8.15～22		

白血病・骨髄異形成症候群

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		ロイケリン	60 mg/m ²	内服	-	29~42		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	1.29		
		キロサイド	40 mg/body	髄注	-	1.29		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	1.29		
血-6	ALL-202維持	オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1	28	寛解導入開始日より 満2年の日まで実施
		プレドニン	60 mg/m ²	内服	-	1~5		
		メソトレキセート	20 mg/m ²	内服	-	1.8.15.22		
		ロイケリン	60 mg/m ²	内服	就寝前	1~28		
血-7	Hyper-CVAD	エンドキサン	300×2 mg/m ²	点滴静注	3時間	1~3	21	
		ドキシソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注	30分	4		
		オンコビン	1.4 mg/m ²	点滴静注	15分	4.11		
		デカドロン	40 mg/body	内服	-	1~4.11~14		内服でも可
血-8	MA	メソトレキセート	200 mg/m ²	点滴静注		1	21	
		メソトレキセート	800 mg/m ²	点滴静注		1		
		キロサイド	2000×2 mg/m ²	点滴静注	3時間	2.3		
血-9	Ph + ALL208寛解導入 (15~59歳)	エンドキサン	1200 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	42	
		ダウノマイシン	60 mg/m ²	点滴静注	1時間	1~3		
		オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1.8.15.22		
		プレドニン	60 mg/m ²	内服	-	1~21		
		イマチニブ	600 mg/body	内服	-	8~42		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	29		
		キロサイド	40 mg/body	髄注	-	29		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	29		
血-10	Ph + ALL208寛解導入	エンドキサン	800 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	42	

白血病・骨髄異形成症候群

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
	(60歳以上)	ダウノマイシン	30 mg/m ²	点滴静注	1時間	1~3		
		オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1.8.15.22		
		プレドニン	60 mg/m ²	内服	-	1~7		
		イマチニブ	600 mg/body	内服	-	8~42		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	29		
		キロサイド	40 mg/body	髄注	-	29		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	29		
血-11	Ph+ALL208地固め①	メソトレキセート	1000 mg/m ²	点滴静注	24時間	1	28	①→②：4サイクル
		キロサイド	2000×2 mg/m ²	点滴静注	3時間×2	2.3		60歳以上は1000mg/m ² ×2
		ソル・メドロール	50 mg/body	点滴静注	×2	1~3		
		イマチニブ	600 mg/body	内服	-	4~21		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	1		
		キロサイド	40 mg/body	髄注	-	1		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	1		
血-12	Ph+ALL208地固め②	エンドキサン	1200 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	28	①→②：4サイクル
		ダウノマイシン	60 mg/m ²	点滴静注	1時間	1		
		オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1		
		プレドニン	60 mg/m ²	内服	-	1~7		
		イマチニブ	600 mg/body	内服	-	2~21		
		メソトレキセート	15 mg/body	髄注	-	1		
		キロサイド	40 mg/body	髄注	-	1		
		デキサート	3.3 mg/body	髄注	-	1		
血-13	Ph+ALL208維持	オンコビン	1.3 mg/m ²	点滴静注	15分	1	28	電解到達後2年目になるまで
		プレドニン	60 mg/m ²	内服	-	1~5		
		イマチニブ	600 mg/body	内服	-	1~28		

白血病・骨髄異形成症候群

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
血-14	マイロターゲット	マイロターゲット	9 mg/m ²	点滴静注	2時間	1	14	2クールまで
血-15	マイロターゲット分割	マイロターゲット	3 mg/m ²	点滴静注	2時間	1.4.7	14	2クールまで
血-16	キロサイド + ベネクレクタ	キロサイド	20 mg/m ²	皮下注	-	1~10	28	100→200→400→600mg
		ベネクレクタ	600 mg/body	内服	1日1回	1~28		
血-17	ビダーザ + ベネクレクタ	ビダーザ	75 mg/m ²	皮下注	-	1~7	28	100→200→400mg
		ベネクレクタ	400 mg/body	内服	1日1回	1~28		
血-18	ビダーザ (AML)	ビダーザ	75 mg/m ²	皮下注	-	1~7	28	
血-19	APL204寛解導入B	イダマイシン	12 mg/m ²	点滴静注	30分	1.2	28	地固め開始前日まで
		キロサイド	100 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~5		
		ベサノイド	45 mg/m ²	点滴静注	分3	連日		
血-20	APL204寛解導入C	イダマイシン	12 mg/m ²	点滴静注	30	1~3	28	地固め開始前日まで
		キロサイド	100 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~7		
		ベサノイド	45 mg/m ²	点滴静注	分3	連日		
血-21	APL204地固めC1	ノバントロン	7 mg/m ²	点滴静注	30分	1~3	28	
		キロサイド	200 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~5		
血-22	寛解導入 3/7	イダマイシン	12 mg/m ²	点滴静注	30	1~3	28	
		キロサイド	100 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~7		
血-23	寛解導入DNR + AraC	ダウノマイシン	50 mg/m ²	点滴静注	30分	1~5	28	
		キロサイド	100 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~7		
血-24	AML201地固め①MA	ノバントロン	7 mg/m ²	点滴静注	30分	1~3	28	
		キロサイド	200 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~5		
血-25	AML201地固め②DA	ダウノマイシン	50 mg/m ²	点滴静注	30分	1~3	28	
		キロサイド	200 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~5		
血-26	AML201地固め③AA	アクラシノン	20 mg/m ²	点滴静注	30分	1~5	28	
		キロサイド	200 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~5		

白血病・骨髄異形成症候群

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
血-27	AML201地固め④Atrip	エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	1時間	1~5	28	
		キロサイド	200 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~5		
		オンコビン	0.8 mg/m ²	点滴静注	10分	8		
		フィルデシン	2 mg/m ²	点滴静注	10分	10		
血-28	AML201地固めAraC大	キロサイド	2000×2 mg/m ²	点滴静注	3時間×2	1~5	28	3クール
血-29	LSG15 (A)VCAP	オンコビン	1 mg/m ²	点滴静注	15分	1	7	(A)day1
		ドキシソルビシン	40 mg/m ²	点滴静注	30分	1		
		エンドキサン	350 mg/m ²	点滴静注	3時間	1		
血-30	LSG15 (B)AMP	ドキシソルビシン	30 mg/m ²	点滴静注	30分	1	7	(B)day8
		サイメリン	60 mg/m ²	点滴静注	1時間	1		
		プレドニン	40 mg/m ²	点滴静注	分1	1		
血-31	LSG15 (C)VECP	フィルデシン	2.4 mg/m ²	点滴静注	10分	1	14	(C)day15 (A) (B) (C) : 28日間1クール
		エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~3		
		カルボプラチン	250 mg/m ²	点滴静注	2時間	1		
血-32	CA	アクラシノン	14 mg/m ²	点滴静注	30分	1~4	28	
		キロサイド	20 mg/m ²	点滴静注	24時間	1~14		
血-33	CA (皮下注)	アクラシノン	14 mg/m ²	点滴静注	30分	1~4	28	
		キロサイド	10×2 mg/m ²	皮下注	-	1~14		
血-34	ビダーザ (MDS)	ビダーザ	75 mg/m ²	皮下注	-	1~7	28	

2022/4現在