

## 大腸がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
大腸-1	IRIS	イリノテカン エスワン	125 mg/m <sup>2</sup> 80~120 mg/body	点滴静注 内服	90分 朝夕食後	1.15 1~14	28	
大腸-2	mFOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	2時間 2時間 15分 46時間	1 1 1 1	14	
大腸-3	ヤーボイ+オブジーボ	ヤーボイ オブジーボ ※5クール目以降 オブジーボ	1 mg/kg 240 mg/body 240 mg/body	点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 30分 30分	1 1 1	21 14	4クールまで併用 5クール目以降単独投与
大腸-4	BV+IRIS	アバスチン イリノテカン エスワン	5 mg/kg 125 mg/m <sup>2</sup> 80~120 mg/body	点滴静注 点滴静注 内服	90→60→30分 90分 朝夕食後	1.15 1.15 1~14	28	
大腸-5	BV+SOX	アバスチン エルプラット エスワン	7.5 mg/kg 130 mg/m <sup>2</sup> 80~120 mg/body	点滴静注 点滴静注 内服	90→60→30分 2時間 朝夕食後	1 1 1~14	21	
大腸-6	BV+XELIRI	アバスチン イリノテカン カペシタビン	7.5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 1600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 内服	90→60→30分 90分 朝夕食後	1 1 1~14	21	
大腸-7	BV+XELOX (CAPOX)	アバスチン エルプラット カペシタビン	7.5 mg/kg 130 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 内服	90→60→30分 2時間 朝夕食後	1 1 1~14	21	カペシタビン：C法
大腸-8	BV+mFOLFOX6	アバスチン レボホリナート エルプラット フルオロウラシル	5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	90→60→30分 2時間 2時間 15分	1 1 1 1	14	

## 大腸がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
大腸-9	BV + FOLFIRI	フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1	14	
		アバスチン	5 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-10	BV + FOLFOXIRI	アバスチン	5 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1	14	
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
		エルプラット	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-11	FOLFIRI	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	14	
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-12	Pmab	ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	
大腸-13	Pmab + mFOLFOX6	ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		エルプラット	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-14	Pmab + IRI	ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
大腸-15	Pmab + FOLFIRI	ベクティビックス	6 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		

## 大腸がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-16	Rmab + FOLFIRI	サイラムザ	8 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-17	SOX	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	21	
		エスワン	80~120 mg/body	内服	朝夕食後	1~14		
大腸-18	Cmab + IRIS	アービタックス	400→250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15.22	28	
		イリノテカン	125 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.15		
		エスワン	80~120 mg/body	内服	朝夕食後	1~14		
大腸-19	Cmab単剤	アービタックス	400→250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	7	
大腸-20	Cmab + CPT-11	アービタックス	400→250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8	14	
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
大腸-21	Cmab + FOLFIRI	アービタックス	400→250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8	14	
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-22	Cmab + SOX	アービタックス	400→250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15	21	
		エルプラット	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		エスワン	80~120 mg/body	内服	朝夕食後	1~14		
大腸-23	Cmab + mFOLFOX6	アービタックス	400→250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8	14	

## 大腸がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		エルプラット	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-24	ザルトラップ + FOLFIRI	ザルトラップ	4 mg/kg	点滴静注	1時間	1	14	
		レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
大腸-25	CAPOX	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	21	
		カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup>	内服	朝夕食後	1~14		カペシタビン：C法
大腸-26	オブジーボ	オブジーボ	240 mg/body	点滴静注	30分	1	14	MSI-High
大腸-27	オブジーボ	オブジーボ	480 mg/body	点滴静注	30分	1	28	MSI-High

2022/4現在