

## 婦人科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
婦-1	AP	ドキソルビシン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	28	卵巣がん、子宮体がん
		シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
婦-2	BEP	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1~5	21	卵巣がん、胚細胞性腫瘍
		シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1~5		
		ブレオ	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	2.9.16		
婦-3	BV (維持)	アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	卵巣がん、子宮頸がん
婦-4	BV+リムパーザ (維持)	アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	卵巣がん、子宮頸がん
		リムパーザ	600 mg/body	内服	朝夕	1~21		卵巣がん、子宮頸がん
婦-5	BV+GEM	アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1	28	卵巣がん
		ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15		
婦-6	C A P	ドキソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1	21	卵巣がん、子宮体がん
		エンドキサン	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		
		シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
婦-7	CPT-11+CDDP	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8.15	28	卵巣がん、子宮頸がん
		シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
婦-8	CPT-11	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8.15	28	卵巣がん
婦-9	DOC+GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	子宮体がん (肉腫)
		ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
婦-10	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	卵巣がん
婦-11	PAC+CDDP	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1	28	卵巣がん、子宮体がん
		シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
婦-12	PAC+CDDP+BV	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1	28	卵巣がん、子宮体がん
		シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
婦-13	weeklyPTX	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15	28	卵巣がん

## 婦人科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
婦-14	ドキシル	ドキシル	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	28	卵巣がん
婦-15	weeklyCDDP + RT	シスプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	7	5クール 子宮頸がん
婦-16	ハイカムチン	ハイカムチン	1.25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1~5	21	子宮頸がん
婦-17	DC	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	2時間	1		
婦-18	DC + BV	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	2時間	1		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
婦-19	TC	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	2時間	1		
婦-20	TC + BV	パクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	2時間	1		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
婦-21	weeklyTC	パクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	2 AUC	点滴静注	1時間	1.8.15		
婦-22	weeklyTC + BV	パクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8.15	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	2 AUC	点滴静注	1時間	1.8.15		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
婦-23	BV + CPT-11	アバスチン	15 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90→60→30分	1	28	卵巣がん
		イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8.15		
婦-24	CPT-11 + NDP	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8	28	子宮頸がん
		アクプラ	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
婦-25	CPT-11 + NDP + BV	イリノテカン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.8	28	子宮頸がん
		アクプラ	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		

## 婦人科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
婦-26	キイトルーダ <sup>®</sup> + レンビマ	キイトルーダ <sup>®</sup> レンビマ	200 mg/body 20 mg/body	点滴静注 内服	30分 1日1回	1 1~21	21	子宮体がん キイトルーダ <sup>®</sup> 400mg6週毎も可

2022/4現在