

## 肝臓がん、胆道がん、膵臓がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
膵-1	GEM + 放射線	ゲムシタビン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	放射線終了後は1000mg/m <sup>2</sup>
胆-2	GEM + S-1	ゲムシタビン エスワン	1000 mg/m <sup>2</sup> 60~100 mg/body	点滴静注 内服	30分 朝夕食後	1.8 1~14	21	
胆-3	GEM + CDDP	ゲムシタビン シスプラチニ	1000 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	30分 1時間	1.8 1.8	21	
膵-4	IRIS	イリノテカン エスワン	100 mg/m <sup>2</sup> 80~120 mg/body	点滴静注 内服	90分 朝夕食後	1.15 1~14	28	
膵-5	FOLFIRINOX	レボホリナート オキサリプラチニ イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 180 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	2時間 2時間 90分 15分 46時間	1 1 1 1 1	14	
膵-6	GEM + nabPTX	アブラキサン ゲムシタビン	125 mg/m <sup>2</sup> 1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	30分 30分	1.8.15 1.8.15	28	
膵-7	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	
膵-8	GEM + タルセバ	ゲムシタビン タルセバ	1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/body	点滴静注 内服	30分 空腹時	1.8.15 連日	28	
肝-9	FMP	ノバントロン シスプラチニ フルオロウラシル	6 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup> 450 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 2時間 持続	1 1 1~5	28	
肝-10	low-doseFP	シスプラチニ フルオロウラシル	10 mg/body 250 mg/body	肝動注 肝動注	30分 持続	1 1~5	7	4週繰り返し、2週休薬 (42日間1クール)
肝-11	NewFP	アイエーコール フルオロウラシル	50 mg/body 750 mg/body	肝動注 肝動注	30分 3時間	1 1	14	
肝-12	テセントリク + BV	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	60~30分	1	21	

## 肝臓がん、胆道がん、膵臓がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
胆-13	GEM + CDDP + S-1	アバスチン ゲムシタビン シスプラチニン エスワン	15 mg/kg 1000 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup> 80~120 mg/body	点滴静注 点滴静注 点滴静注 内服	90→60→30分 30分 1時間 朝夕食後	1 1 1 1~7	14	

2022.4現在