

## 食道がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
食道-1	5-FU+CDGP (high)	アクプラ	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	28	
		フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~5		
食道-2	DOC	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	
食道-3	FP+RT併用	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	28	
		フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~4		
食道-4	FP	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	28	
		フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~5		
食道-5	VNR+CDDP	ロゼウス	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1.8	21	
		シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
食道-6	biweeklyDOC+CDGP	ドセタキセル	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	14	
		アクプラ	30 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
食道-7	オプジーボ (2週毎)	オプジーボ	240 mg/body	点滴静注	30分	1	14	
食道-8	オプジーボ (4週毎)	オプジーボ	480 mg/body	点滴静注	30分	1	28	
食道-9	5-FU+CDGP (low)	アクプラ	5 mg/body	点滴静注	2時間	1~5、8~12 15~19、22~26	28	
		フルオロウラシル	500 mg/body	点滴静注	24時間	1~5、8~12 15~19、22~26		
食道-10	キイトルーダ+FP	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	
		シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		フルオロウラシル	800 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~5		

2023/4現在