

## 多発性骨髄腫・その他

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
MM-1	C-VAD	エンドキサン	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1.8	21	ドキルビシシ・オコピン混合
		ドキソルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~4		
		オンコビン	0.5 mg/body	点滴静注	24時間	1~4		
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	1~4		
MM-2	CPA大量（幹細胞採取）	エンドキサン	2000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1.2	14	
MM-3	VAD	ドキソルビシン	9 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	1~4	28	
		オンコビン	0.4 mg/body	点滴静注	24時間	1~4		
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	30分	1~4		
MM-4	DB d ①~③クール目	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.4.8.11	21	day15のDexは医師判断で投与 80mg/週（内服可）
		ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.8.15		
		デキサメタゾン	20 mg/body	点滴静注	15分	1.2.4.5.8.9.11.12		
	DB d ④~⑥クール目	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.4.8.11	21	80mg/週（内服可）
		ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1		
		デキサート	20 mg/body	点滴静注	15分	1.2.4.5.8.9.11.12		
	DB d ⑦クール目以降	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1	28	day1のDexは医師判断で投与
MM-5	DL d ①、②クール目 （再発難治）	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.8.15.22	28	40mg/週（内服可）
		レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサート	20 mg/body	点滴静注	15分	2.8.9.15.16.22.23		
	DL d ③~⑥クール目 （再発難治）	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.15	28	40mg/週（内服可）
	レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1~21			
	デキサート	20 mg/body	点滴静注	15分	1.2.8.15.16.22			
	DL d ⑦クール目以降 （再発難治）	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1	28	40mg/週（内服可）
		レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサート	20 mg/body	点滴静注	15分	1.8.15.22		
MM-6	DL d ①、②クール目	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.8.15.22	28	

## 多発性骨髄腫・その他

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
	(未治療)	レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサート	40 mg/body	点滴静注	15分	1.8.15.22		40mg/週 (内服可)
	DL d③~⑥クール目 (未治療)	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.15	28	
		レブラミド	25 mg/body	点滴静注	分1	1~21		
		デキサート	20 mg/body	点滴静注	15分	1.8.15.22		40mg/週 (内服可)
	DL d⑦クール目以降 (未治療)	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1	28	
		レブラミド	25 mg/body	点滴静注	分1	1~21		
		デキサート	20 mg/body	点滴静注	15分	1.8.15.22		40mg/週 (内服可)
MM-7	DMPB①クール目	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.4.8.11.22.25.29.32	42	
		ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.8.15.22.29.36		
		アルケラン	9 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1	1~4		
		プレドニン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1~2	2~4		
	DMPB②~⑨クール目	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.8.22.29	42	
		ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.22		
		アルケラン	9 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1	1~4		
		プレドニン	60 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1~2	2~4		
	DMPB⑩クール目以降	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1	28	
MM-8	KR d①クール目	カイプロリス	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1.2	28	
		カイプロリス	27 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	8.9.15.16		
		レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	1.8.15.22		
	KR d②~⑫クール目	カイプロリス	27 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1.2.8.9.15.16	28	
		レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	1.8.15.22		
	KR d⑬クール目以降	カイプロリス	27 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	1.2.15.16	28	

## 多発性骨髄腫・その他

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
MM-9	Kd①クール目	レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1~21	28	40mg/週
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	1.8.15.22		
		カイプロリス	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.2		
	カイプロリス	56 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	8.9.15.16			
	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	分1	1.2.8.9.15.16.22.23			
	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	分1	1.2.8.9.15.16.22.23			
MM-10	VRd lite	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.8.15.22	35	
		レブラミド	15 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサメタゾン	20 mg/body	内服	分1	1.2.8.9.15.16.22.23		
MM-11	VRd (3週毎)	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.4.8.11	21	
		レブラミド	15 mg/body	内服	分1	1~14		
		デキサメタゾン	20 mg/body	内服	分1	1.2.4.5.8.9.11.12		
MM-12	Bd (3週毎)	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.4.8.11	21	
		デキサメタゾン	20 mg/body	内服	分1	1.2.4.5.8.9.11.12		
MM-13	Bd (4週毎)	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.8.15	28	
		デキサメタゾン	20 mg/body	内服	分1	1.2.8.9.15.16		
MM-14	エムプリシティ+レブラミド +デキサメタゾン ①、②クール目	エムプリシティ	10 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.8.15.22	28	エムプリシティ投与3~24時間前 エムプリシティ投与1時間前
		レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサメタゾン	28 mg/body	内服	分1	1.8.15.22		
		デキサート	6.6 mg/body	点滴静注	15分	1.8.15.22		

## 多発性骨髄腫・その他

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
	EM <sup>®</sup> リシティ+レブ <sup>®</sup> ラミド <sup>®</sup> +デキサメタゾン ③クール目以降	エムプリシティ	10 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.15	28	EM <sup>®</sup> リシティ投与3～24時間前
		レブラミド	25 mg/body	内服	分1	1～21		
		デキサメタゾン	28 mg/body	内服	分1	1.15		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	8.22		
		デキサート	6.6 mg/body	点滴静注	15分	1.15		
MM-15	L-PAM	アルケラン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.2	-	造血幹細胞移植前
胸腺腫-16	CAP	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1	21	胸腺腫
		エンドキサン	500 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	1		
		シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
MM-17	Dkd①	ダラザレックス	8 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.2	28	75歳以上は20mg/週
		ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	8.15.22		
		カイプロリス	20 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.2		
		カイプロリス	56 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	8.9, 15.16		
		デキサメタゾン	20 mg/body	内服	-	1.2, 8.9, 15.16		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	-	22		
	Dkd②	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.8.15.22	28	75歳以上は20mg/週
		カイプロリス	56 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.2, 8.9, 15.16		
		デキサメタゾン	20 mg/body	内服	-	1.2, 8.9, 15.16		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	-	22		
Dkd③～⑥		ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.15	28	75歳以上は20mg/週
		カイプロリス	56 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.2, 8.9, 15.16		
		デキサメタゾン	20 mg/body	内服	-	1.2, 8.9, 15.16		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	-	22		

## 多発性骨髄腫・その他

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
MM-18	Dkd⑦	ダラザレックス	16 mg/kg	点滴静注	規定速度	1	28	75歳以上は20mg/週
		カイプロリス	56 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.2, 8.9, 15.16		
		デキサメタゾン	20 mg/body	内服	-	1.2, 8.9, 15.16		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	-	22		
MM-18	IsaPD①	サークリサ	10 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.8.15.22	28	75歳以上は20mg/週
		ポマリスト	4 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサメタゾン	40 mg/body	点滴静注	-	1.8.15.22		
	IsaPD②以降	サークリサ	10 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.15	28	75歳以上は20mg/週
		ポマリスト	4 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサメタゾン	40 mg/body	点滴静注	-	1.8.15.22		
MM-19	Em <sup>o</sup> リシティ+ポ マリスト+ デ キサメタゾ ン ①、②クール目	エムプリシティ	10 mg/kg	点滴静注	規定速度	1.8.15.22	28	Em <sup>o</sup> リシティ投与3~24時間前 Em <sup>o</sup> リシティ投与1時間前
		ポマリスト	4 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサメタゾン	28 mg/body	内服	分1	1.8.15.22		
		デキサート	6.6 mg/body	点滴静注	15分	1.8.15.22		
	Em <sup>o</sup> リシティ+ポ マリスト+ デ キサメタゾ ン ③クール目以降	エムプリシティ	20 mg/kg	点滴静注	規定速度	1	28	Em <sup>o</sup> リシティ投与3~24時間前 Em <sup>o</sup> リシティ投与1時間前
		ポマリスト	4 mg/body	内服	分1	1~21		
		デキサメタゾン	28 mg/body	内服	分1	1		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	8.15.22		
		デキサート	6.6 mg/body	点滴静注	15分	1		
MM-20	DP d①、②クール目 (再発難治)	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注	5分	1.8.15.22	28	
		ポマリスト	4 mg/body	内服	分1	1~21		

## 多発性骨髄腫・その他

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
MM-20	DP d ③～⑥クール目 (再発難治)	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	1.8.15.22	28	
		ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注	5分	1.15		
		ポマリスト	4 mg/body	内服	分1	1～21		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	1.8.15.22		
	DP d ⑦クール目以降 (再発難治)	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注	5分	1	28	
		ポマリスト	4 mg/body	内服	分1	1～21		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	1.8.15.22		
		ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注	5分	1.8.15.22		
	DCyBorD①、②クール	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注	5分	1.8.15.22	28	全身性アミロイドーシス 点滴も可、最大500mg
		エンドキサン	300 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1	1.8.15.22		
		ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.8.15.22		
		デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	1.8.15.22		
DCyBorD③～⑥クール	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注	5分	1.15	28	全身性アミロイドーシス 点滴も可、最大500mg	
	エンドキサン	300 mg/m <sup>2</sup>	内服	分1	1.8.15.22			
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m <sup>2</sup>	皮下注	-	1.8.15.22			
	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	分1	1.8.15.22			
DCyBorD⑦クール目以	ダラキューロ	1800 mg/body	皮下注	5分	1.15	28	全身性アミロイドーシス	

2023/4現在