

婦人科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
婦-1	AP	ドキソルビシン	60 mg/m ²	点滴静注	15分	1	28	卵巣がん、子宮体がん
		シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	2時間	1		
婦-2	BEP	エトポシド	100 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5	21	卵巣がん、胚細胞性腫瘍
		シスプラチン	20 mg/m ²	点滴静注	2時間	1~5		
		ブレオ	20 mg/m ²	点滴静注	1時間	2.9.16		
婦-3	BV (維持)	アバスタチン	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	卵巣がん、子宮頸がん
婦-4	BV+リムパーザ (維持)	アバスタチン	15 mg/kg	点滴静注	30分	1	21	卵巣がん、子宮頸がん
		リムパーザ	600 mg/body	内服	朝夕	1~21		卵巣がん、子宮頸がん
婦-5	BV+GEM	アバスタチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1	28	卵巣がん
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	1.8.15		
婦-6	C A P	ドキソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注	15分	1	21	卵巣がん、子宮体がん
		エンドキサン	500 mg/m ²	点滴静注	30分	1		
		シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	2時間	1		
婦-7	CPT-11+CDDP	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	1.8.15	28	卵巣がん、子宮頸がん
		シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	2時間	1		
婦-8	CPT-11	イリノテカン	100 mg/m ²	点滴静注	90分	1.8.15	28	卵巣がん
婦-9	DOC+GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	1.8.15	28	子宮体がん (肉腫)
		ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	1時間	1		
婦-10	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	30分	1.8.15	28	卵巣がん
婦-11	PAC+CDDP	パクリタキセル	180 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	28	卵巣がん、子宮体がん
		シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	2時間	1		
婦-12	PAC+CDDP+BV	パクリタキセル	180 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	28	卵巣がん、子宮体がん
		シスプラチン	50 mg/m ²	点滴静注	2時間	1		
		アバスタチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
婦-13	weeklyPTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	1時間	1.8.15	28	卵巣がん

婦人科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
婦-14	ドキシル	ドキシル	50 mg/m ²	点滴静注	2時間	1	28	卵巣がん
婦-15	weeklyCDDP + RT	シスプラチン	40 mg/m ²	点滴静注	2時間	1	7	5クール 子宮頸がん
婦-16	ハイカムチン	ハイカムチン	1.25 mg/m ²	点滴静注	30分	1~5	21	子宮頸がん
婦-17	DC	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	1時間	1	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	2時間	1		
婦-18	DC + BV	ドセタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	1時間	1	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	2時間	1		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
婦-19	TC	パクリタキセル	180 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	2時間	1		
婦-20	TC + BV	パクリタキセル	180 mg/m ²	点滴静注	3時間	1	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	6 AUC	点滴静注	2時間	1		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
婦-21	weeklyTC	パクリタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	1時間	1.8.15	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	2 AUC	点滴静注	1時間	1.8.15		
婦-22	weeklyTC + BV	パクリタキセル	70 mg/m ²	点滴静注	1時間	1.8.15	21	卵巣、子宮頸、子宮体がん
		カルボプラチン	2 AUC	点滴静注	1時間	1.8.15		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		
婦-23	BV + CPT-11	アバスチン	15 mg/m ²	点滴静注	90→60→30分	1	28	卵巣がん
		イリノテカン	100 mg/m ²	点滴静注	90分	1.8.15		
婦-24	CPT-11 + NDP	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	1.8	28	子宮頸がん
		アクプラ	80 mg/m ²	点滴静注	2時間	1		
婦-25	CPT-11 + NDP + BV	イリノテカン	60 mg/m ²	点滴静注	90分	1.8	28	子宮頸がん
		アクプラ	80 mg/m ²	点滴静注	2時間	1		
		アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1		

婦人科がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
婦-26	キイトルーダ [®] + レンビマ	キイトルーダ レンビマ	200 mg/body 20 mg/body	点滴静注 内服	30分 1日1回	1 1~21	21	子宮体がん キイトルーダ [®] 400mg6週毎も可
婦-27	アクチマイシンD単剤	コスメゲン	0.01 mg/kg	静注	-	1~5	14	侵入奇胎
婦-28	キイトルーダ [®] + T C	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチン	200 mg/body 175 mg/m ² 5 AUC	点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 3時間 2時間	1 1 1	21	子宮頸がん 最大6クール
婦-29	キイトルーダ [®] + T C + BV	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチン アバスチン	200 mg/body 175 mg/m ² 5 AUC 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 3時間 2時間 90→60→30分	1 1 1 1	21	子宮頸がん 最大6クール
婦-30	キイトルーダ [®] + PAC + CDDP	キイトルーダ パクリタキセル シスプラチン	200 mg/body 175 mg/m ² 50 mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 3時間 2時間	1 1 1	21	子宮頸がん 最大6クール
婦-31	キイトルーダ [®] + PAC + CDDP + BV	キイトルーダ パクリタキセル シスプラチン アバスチン	200 mg/body 175 mg/m ² 50 mg/m ² 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	30分 3時間 2時間 90→60→30分	1 1 1 1	21	子宮頸がん 最大6クール
婦-32	キイトルーダ [®] + BV (維持療法)	キイトルーダ アバスチン	200 mg/body 15 mg/kg	点滴静注 点滴静注	30分 30分	1 1	21	子宮頸がん キイトルーダ [®] は最大35回
婦-33	キイトルーダ [®] (維持療法)	キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	30分	1	21	子宮頸がん キイトルーダ [®] は最大35回
婦-34	リブタヨ	リブタヨ	350 mg/body	点滴静注	30分	1	21	子宮頸がん (2次以降)

2023/4現在