

## 肝臓がん、胆道がん、膵臓がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
膵-1	GEM + 放射線	ゲムシタビン	600 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	放射線終了後は1000mg/m <sup>2</sup>
胆-2	GEM + S-1	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
		エスワン	60~100 mg/body	内服	朝夕食後	1~14		
胆-3	GEM + CDDP	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8	21	
		シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8		
膵-4	IRIS	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1.15	28	
		エスワン	80~120 mg/body	内服	朝夕食後	1~14		
膵-5	FOLFIRINOX	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1	14	
		オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		イリノテカン	180 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	1		
		フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	1		
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	1		
膵-6	GEM + nabPTX	アブラキサン	125 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	
		ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15		
膵-7	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	
膵-8	GEM + タルセバ	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8.15	28	
		タルセバ	100 mg/body	内服	空腹時	連日		
肝-9	FMP	ノバントロン	6 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1	28	
		シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	1		
		フルオロウラシル	450 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	持続	1~5		
肝-10	low-doseFP	シスプラチン	10 mg/body	肝動注	30分	1	7	4週繰り返し、2週休薬 (42日間1クール)
		フルオロウラシル	250 mg/body	肝動注	持続	1~5		
肝-11	NewFP	アイエーコール	50 mg/body	肝動注	30分	1	14	
		フルオロウラシル	750 mg/body	肝動注	3時間	1		
肝-12	テセントリク + BV	テセントリク	1200 mg/body	点滴静注	60→30分	1	21	

## 肝臓がん、胆道がん、膵臓がん

登録番号	レジメン名称	薬剤名	1日基準投与量 (mg)	投与経路	投与時間	投与日 (日目)	1クール (日間)	備考
胆-13	GEM + CDDP + S-1	アバスチン	15 mg/kg	点滴静注	90→60→30分	1	14	
		ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1		
		シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1		
		エスワン	80~120 mg/body	内服	朝夕食後	1~7		
胆-14	イミフィンジ + GEM + CDDP	イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	1時間	1	21	最大8クール (以後はイミフィンジ単 独で継続)
		ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	1.8		
		シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	1.8		
		イミフィンジ	1500 mg/body	点滴静注	1時間	1		

2023.4現在